

Poniendo a prueba hipótesis de cambio: un estudio sistemático de caso único de psicoterapia psicoanalítica, utilizando el modelo de los tres niveles (3lm). Caso Gonzalo.

OBJETIVO GENERAL: Efectuar un estudio sistemático de caso único de psicoterapia psicoanalítica, evaluando hipótesis de cambio iniciales, generadas a partir de las primeras 4 entrevistas, y poniéndolas a prueba luego de 1 de tratamiento, combinando la metodología 3LM con criterios de cambio estructural y cambio sintomático.

DIRECTORA: Dra. Rodríguez Quiroga, Andrea (IUSAM- USAL- UCA)

CODIRECTOR: Dr. Santiago, Juan

RADICACIÓN: Departamento de Investigación de IUSAM

VINCULACION CON CARRERAS POSGRADO IUSAM: Especialización en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes

EQUIPO:

APELLIDO Y NOMBRE	POSGRADO IUSAM Y FUNCIÓN DE PERTENENCIA	ROL QUE DESEMPEÑA	HORAS MENSUALES DEDICADAS AL PROYECTO	INTEGRANTE EXTERNO INDICAR INSTITUCIÓN	DNI
Rodríguez Quiroga Andrea	EÑA-D	DIR	10	IUSAM; USAL; UCA	12.045.298
Santiago Juan	MPM-D	CD I-Principal	10	IUSAM; UBA: USAL	27.860.983
Bongiardin o Laura	EÑA-G	I-Adjunto	10	IUSAM; USAL	25.659.431
Aufenacker Saskia Ivana	EÑA-G	I-Asistente	10	IUSAM; USAL	93.733.424
Borensztei n Laura	MFP-G	I-Adjunto	10		13.120.364

FECHA DE INICIO PROYECTO: marzo de 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTO: marzo de 2021

RESUMEN TÉCNICO

Las entrevistas iniciales de un tratamiento comprenden criterios de: diagnóstico, pronóstico, indicación y planificación terapéuticas (Grupo de Trabajo OPD, 2006/2008; Kernberg, 2006; PDM Task Force, 2006). El modelo 3LM (Bernardi, 2015 a y b) permite ver, o no, las transformaciones del paciente a lo largo de un tratamiento de manera sistemática y grupal.

El objetivo general de esta investigación es evaluar las hipótesis de cambio formuladas mediante el 3LM a partir de las primeras 4 entrevistas, en un estudio de caso Angeles de psicoterapia psicoanalítica, analizando el proceso y resultado al interrumpirse. El proyecto apunta a: 1) identificar puntos de anclaje 3LM y focos OPD-2 en las primeras entrevistas y analizar su evolución, 2) evaluar las hipótesis de cambio 3LM iniciales, teniendo en cuenta el grado de cambio sintomático según el OQ.45 (Lambert et al., 1996), las hipótesis 3LM y el grado de cambio estructural según criterios OPD-2 (Grupo de trabajo OPD, 2006/2008), 3) describir similitudes y diferencias entre: a) los juicios clínicos según el 3LM, b) cambio estructural según OPD-2, y c) las puntuaciones del OQ.45. Se busca analizar los posibles vínculos entre diferentes niveles de cambio en una psicoterapia.

Los resultados tendrán como eje poner a prueba las hipótesis generadas al comienzo del tratamiento. Esto posibilita a futuro, comparar casos de abandono versus casos de alta terapéutica (Juan, Chávez, Lopez Fediuk, Manubens y Gómez Penedo, 2018; Rodriguez Quiroga, Marengo, Corbella y Borenstein; 2018).

Palabras clave 3LM; hipótesis de cambio; psicoterapia psicoanalítica; estudio sistemático de caso único; OPD-2; cambio estructural

Nota: Si requiere del proyecto de investigación completo puede solicitarlo a investigacion@iusam.edu.ar